


University of California, San Francisco

From the Selected Works of Rachid ELAÏDI

Fall October 17, 2023

Les Nevanlinna.pdf

Rachid ELAÏDI, *University of California - Berkeley*



Rachid ELAÏDI

Le 17/10/2023

sujet :

Les 60 théorèmes sur les fonctions entières méromorphes...

Il s'agit d'un essai universitaire pour démontrer la validité de l'intelligence artificielle et j'ai utilisé beaucoup de ces applications, de l'intelligence artificielle, pour diriger un travail de recherche en mathématique et je constatet qu 'il existe seulement une validité au plus égale à 89% et donc l'intelligence artificielle a encore des efforts à faire pour une perfection de plus de 99% .

Le directeur de cette recherche en mathématique est justement l'intelligence artificielle . Et il n'est pas exclu de trouver des erreurs voire des fautes car ce travail dépend comme tous travaux de cette nature;publication , post thèse...du niveau intellectuel du directeur de recherche , par conséquent, le mien est justement l'intelligence artificielle de 2023 étant donné que la plupart de ces applications ont une programmation jusqu'au 2021 qui veut dire que l'intelligence artificielle n'a pas d'autres informations plus récentes.

Le sujet que j'ai choisi est la fonction méromorphe , holomorphe, entière, ...selon Nevanlinna et donc j'ai fait tourné le sujet sur tous(ou presque)ses angles.

Et donc il y a une soixantaine de théorème tous ont été validé par l'intelligence artificielle. Et donc, par voie de conséquence ,ces théorèmes sont encore une fois à vérifier au sens classique du terme . Néanmoins ,ils sont utilisables dans plusieurs domaines et de l'ingénierie, la médecine et éventuellement en mathématique et dans d'autres domaines de la science.

1

Et chaque fois que je pouvais, j'introduisais dans les explications données par l'intelligence artificielle sur une validité de ce que l'intelligence artificielle avance comme explication sur le pourquoi de ce théorème jugé vrai et j'ajoute de temps en temps cette expression "j'en conviens".

Je ne donne pas trop de références des livres classiques car tout ce travail s'est fait en collaboration trop étroite avec l'intelligence artificielle ,néanmoins ,il est toujours utile de savoir sur les définitions des termes utilisés... et que je préfère une liste des applications de l'intelligence artificielle.

En effet , comme le rôle d'un directeur de recherche est de confirmer ou d'infirmer un travail du thésard ou de celui qui présente une publication universitaire de recherche , a donc un rôle de guide,par contre l'intelligence artificielle va plus loin.

Pour ma part ,l'intelligence artificielle jouait ce rôle de directeur de recherche avec une différence énorme qu'on peut discuter de la validité de ce que le chercheur avance et éventuellement ,il existe une honnêteté de l'intelligence artificielle sous forme de ces expressions "... , je m'excuse , je me suis trompé, excusez la confusion ..." ce genre d'engagement et de savoir s'excuser , qu'aucun directeur de recherche humain ne reconnaît ses propres erreurs,qui montre d'un autre côté,que l'intelligence artificielle a encore des efforts à faire pour une perfection maximale.

Il est donc évident qu'avec le temps , l'intelligence artificielle remplacerait pour du bon le directeur de recherche et sa clique de jury car l'intelligence artificielle développe une intelligence croissante et vivace avec le temps, alors que l'humain se contente d'un niveau stagné et la plupart de temps s'oriente vers d'autres secteurs non productif ,scientifiquement parlant , à l'instar des chercheurs (la plupart font de la recherche et l'enseignement et que tout ce monde souffre de l'inadéquation et donc l'insuffisance de temps d'être complètement engagé dans la recherche qui donne par voie de conséquence, un résultat mitigé ...

Au début ,j'avais voulu faire une thèse de plus et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me proposer un plan de thèse ,chose faite et j'avais suivi ce plan et je me suis rendu compte qu'on peut faire mieux avec l'intelligence artificielle et je me suis donc dirigé vers un développement des théorèmes et au passage , ce travail n'est pas exhaustif et horizontalement et verticalement ; ni au niveau des validités ni au niveau des théorèmes en quantité et je me suis limité à une soixantaine de théorèmes tous de moi ,dont je pourrais faire au moins 10 et facilement.

Certainement , l'intelligence artificielle arriverait à un niveau encore supérieur et tous les théorèmes des chercheurs en mathématiques et dans d'autres disciplines seront ciblés ,à corriger ou à faire des extensions ou encore de les perfectionner et donc de les améliorer. Ce qui est donc valable en mathématique est valable dans tous les autres domaines de la science et de la politique,...

Il est vrai, que les chercheurs dans le futur proche à condition siné-quá-non, pas de guerre nucléaire au niveau mondial...et donc un avenir auront plus de facilité à faire leur recherche sagement et très avancé.

2

Et donc le "robotisme"est une valeur qui est très loin d'être négligeable . Ce qui est important à souligner que tous les métiers du monde y compris les plus compliqués seront facilement accessibles à quelque soit l'individu avec une condition siné_qua- qu'il existe réellement une volonté d'apprendre le savoir...car il n'y aurait plus de complication grâce à l'intelligence artificielle et donc qui serait une question de formation sur le terrain et donc,on peut avoir plusieurs métiers à la fois ; aucune formation ne mérite ces facultés et les années derrière et sur le plan théorique, grâce à l'intelligence artificielle nous compteront les avancées en grands pas et non en accroissement des petits ...

Sans plus tarder en voici les 60 théorèmes que j'avais écrits sur papier et ensuite transférés par système de photos et donc ce sont des OCR ,ces images sont lisibles sur openoffice et donc en PDF ...

Chaque théorème prend ,en gros,une page, numérotées et ces théorèmes ne sont pas classés selon leur importance quoique sont tous important, mais donnés en vrac et qui sont tous importants et aucun théorème ne découle d'un autre théorème ou ...

En effet il s'agit d'un travail énorme et c'est pour cette raison que ce travail universitaire n'est exhaustif , il y a d'autres démonstrations et d'autres théorèmes qui sont plus important que je n'ai pas mentionné par manque de temps .

Les applications de ces théorèmes sont dans beaucoup de domaines scientifique en médecine ,en chimie, ...,en politique, en psy, en socio...il faut avoir une compréhension plus large pour comprendre les applications de ces théorèmes

avec $r = \text{cte}$ \Rightarrow j'intègre par les entées

Théorème (2) Si $\text{class}(A) < \text{class}(B)$ et/ou $e(A) < e(B)$

alors $f'' + A(z)f' + B(z)f = 0$ possède une infinité de solutions

avec la condition aux limites $\left| \begin{array}{l} z = c \text{ (constante réelle)} \\ \text{et à l'origine} \\ z = 0 \end{array} \right.$ à déterminer.

Théorème (3)

Si $\text{Res}(A) < \text{Res}(B)$ alors $f'' + A(z)f' + B(z)f = 0$ possède une infinité de solutions

Théorème (4)

Si f possède un développement en série de Laurent s.p.

alors \exists une infinité de solutions de

$$f'' + A(z)f' + B(z)f = 0$$

Théorème (5)

si $A(z)$ et $B(z)$ sont des polynômes entiers non-constants

et si $\rho(A) < \rho(B)$ et/ou $\text{Res}(A) < \text{Res}(B)$

alors tous les solutions non-triviales de l'équation différentielle linéaire

$$(1) f''(z) + A(z)f'(z) + B(z)f(z) = 0$$

sont d'ordre fini

pour un ordre infini il faut ajouter une condition qui stipule que (1) doit avoir un pt. singulier régulier ∞

par exemple selon I et IV $z \rightarrow \infty$

$$A(z) \rightarrow 0$$

$$B(z) \rightarrow 0$$

$$A'(z) \rightarrow 0$$

$$B'(z) \rightarrow 0$$

$$A''(z) \rightarrow 0$$

$$B''(z) \rightarrow 0$$

et si l'infinité est d'ordre 4 $A'''(z) \rightarrow 0$
 $B'''(z) \rightarrow 0$

..

et donc $f''(z) + A(z)f'(z) + B(z)f(z) = 0$
 a des solutions d'ordre infini.
 c'est une des conditions il y en a d'autres.

et la théorie équivaut au théorème (6)

si $A(z)$ et $B(z)$ sont des fractions entières

et si $\rho(A) < \rho(B)$ alors $\rho_{\text{ess}}(A) < \rho_{\text{ess}}(B)$

et si $\rho(1) = \infty$ a un pt-singulier régulier $\lim_{z \rightarrow \infty} z^2 A(z) = 0$

$\lim_{z \rightarrow \infty} z^2 B(z) = 0$


$\rightarrow 0$

lorsque $z \rightarrow \infty$

alors tous les solutions non-triviales de l'équation différentielle linéaire

$$f''(z) + A(z)f'(z) + B(z)f(z) = 0$$

sont d'ordre infini.



Theorem 6

Si $Q(z) = h(z) \cdot z^{b_2}$ où $h(z)$ est une fonction entière et A -séparable et comme toute fonction entière de degré n est aussi méromorphe

d'ordre $< \frac{1}{2}$ et b_2 est une constante $\in \mathbb{R}$

alors toutes les solutions non-triviales f de:

$$(*) f'' + p(z) f' + Q(z) f = H(z)$$

satisfaisant $\rho(f) = \lambda \log \left(\frac{1}{r} \right) (f-z) = \infty$ à

conclut que $\rho(H) < 1$ pour I.A. ce théorème

et j'ai ajouté les conditions aux limites $f \rightarrow \infty$
 $z = c(e^z) \rightarrow \infty$

et $f \rightarrow 0$ à l'infini

et de plus une hypothèse si $\rho(f) < \rho(H) < 1$

car ce cas seul le théorème est vrai

selon I.A. il est une preuve de la fausseté du théorème sans ajout

Preuve selon I.A. ^(Chap. 1.1) de la proposition affirmant
 l'existence d'une fonction analytique universelle
 à l'université Nanchang présentée par
 cette publication intitulée : (Hong-Yan XLI et
 Ting-Bin CAO)
 Oscillation of solutions of some higher
 order linear differential equations
 (théorème A)

et donc d'après I.A. \exists des points $H(z)$
 pour lesquelles il peut y avoir
 des solutions ayant un rayon de convergence fini
 même si $H(z)$ a un rayon de convergence ∞

alors que la conclusion affirmait que j'ai ajoutée
 $\rho(f) < \rho(H) < 1$ est vraie

car le rayon de convergence de la série de Taylor
 de H centrée en z , noté $\rho(H)$ sera toujours plus grand
 que le rayon de convergence de la série de Taylor de
 f centrée en z , noté $\rho(f)$

et selon une autre I.A.

la première propriété

$$e(f) = \overline{\sigma}(f, g) = \infty \text{ à}$$

condition que $e(H) < 1$

est vrai

appliqué si $e(H) < 1 \Rightarrow H(g) \text{ est d'ordre } > 1$

$\Rightarrow f$ est d'ordre inférieur à 1 (puisque $\lambda > 1$)

$$\text{et puisque } e(f) < e(H)$$

à savoir

∞

∞

\uparrow

\downarrow

2^e si $e(f) < e(H) < 1$ est une conséquence probable

selon une autre I.A.

La preuve à propos finit une théorie

$$e(f) = \overline{\sigma}(f, g) = \infty \text{ à condition } e(H) < 1$$

et il s'agit de Riemann-Hilbert

Théorème 7

$$\text{soit } (1)'' + P(z) f' + Q(z) f = 0$$

avec

$$P(z) = \sum_{r=0}^{\infty} a_r \cdot z^r \text{ et } Q(z) = \sum_{r=0}^{\infty} b_r \cdot z^r$$

si $\rho(P) < \rho(Q)$ \Rightarrow si les conditions aux limites sont :

$$f \rightarrow 0 \text{ et } z = c \cdot e^{\alpha} \rightarrow 0$$

$$b) f \rightarrow 0 \text{ à l'origine } z \rightarrow 0$$

$$3) \rho(P) < \rho(Q)$$

alors (1) possède une infinité de solutions / compris au moins une solution non triviale à ∞

et donc (1) possède une infinité de solutions
selon L.A. vrai (ce théorème est vrai)

expliquant cela I.A. et j'en conclus

$\rho(P) < \rho(Q) \Rightarrow$ la série de P converge à un rayon de convergence plus petit que celui de la série $Q(z)$

et si $\text{Res}(P) < \text{Res}(Q) \Rightarrow$ la partie résiduelle de $P(z)$ est plus petite que celle de $Q(z)$

à conditions (1) provide une infinité de solutions

on peut éventuellement utiliser la méthode de Frobenius pour résoudre cette équation (1) différentielle linéaire du second ordre avec des coefficients dépendant de z

on suppose on Frobenius suppose une solution de la forme

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{(n+r)}$$

Les ent de coefficients déterminés

sont se limite à $0 < r < \infty$ à $0 < r < 5$ par la p.p.

et on a une constante égale à a égale à b_r

jusqu'à ∞

Donc d'après I.A. étant donné les conditions aux

limites quand $z \rightarrow \infty$
 $z = c + it$

selon I.A. $f \rightarrow 0$ = l'origine (zéro)

La méthode de Frobenius présente des
 et donc il faut utiliser la méthode des éléments finis
 ou la méthode des différences finies pour résoudre

$$f''(z) + P(z)f'(z) + Q(z)f(z) = 0$$

Théorème 8

soit f possède plus d'un pt. singulier $K \geq 2$
 $K \rightarrow \infty$

explicit

selon le théorème de Picard,

si f est une et même sur une période

plus de 2 pts singuliers

alors f prend toutes les valeurs petit à petit

Complexe sur \mathbb{C} à l'infini

\Rightarrow une solution non-triviale

Théorème 9

si f possède plus d'un pt. singulier
 $K \geq 2$ $K \rightarrow \infty$

$\Rightarrow f'' + A(z)f' + B(z)f = 0$

et si \$f\$ satisfait aux limites suivantes :

$$1) f \rightarrow \infty$$

$$z = c \cdot e^{-3} \rightarrow \infty$$

2) \$f \rightarrow 0\$ à l'origine

alors \$f'' + A(z) \cdot f'(z) + B(z) \cdot f = 0\$ peut avoir
 une solution non triviale et une infinité de
 solutions

Théorème

\$\Rightarrow\$ si \$Q(z) = h(z) \cdot e^z\$ où \$h(z)\$ est une fonction
 entière et transcendante
 d'ordre \$< \frac{1}{2}\$

et \$h\$ est une constante

\$\Rightarrow\$ toutes les solutions non-triviales

\$f\$ de \$f'' + e^3 f' + Q(z) f = H(z)\$ satisfait

\$\rho(f) = \rho(H) = \infty\$ condition que \$\rho(H) < 1\$

et si on ajoute les conditions aux limites :

1) \$f \rightarrow \infty\$

$$z = c \cdot e^{-3} \rightarrow \infty$$

2) \$f \rightarrow 0\$ à l'origine

\$\rho(f) < \rho(H) < 1\$

selon I.A.
 ce théorème est vrai

avec 3 conditions aux limites, on peut déterminer
les valeurs propres λ et les solutions correspondantes

puisque $e(f) < e(H) < 1$ n'est pas toujours vrai
mais si on limite à 2 conditions

$$e(f) < e(H) < 1$$

soit

$$(1) f'' + e^3 f' + Q(z) \cdot f = H(z)$$

L'équation caractéristique est qui est une équation

que $\boxed{f(z) = e^{\lambda z}}$

en substituant ds (1) on a :

$$\boxed{\lambda^2 + \lambda + Q(z) - H(z)/e^{\lambda z} = 0}$$

et l'équation caractéristique de: $f'' + e^3 f' + Q(z) f = H(z)$

La résolution permettrait de déterminer
les valeurs propres de λ

Théorème 11

Soit f une fonction entière μ -microscopique et transcendente
d'ordre fini et c une constante
complexe non nulle et

$g(z+c)$ et $h(z+c)$ des fonctions
microscopiques; $\rho(g) < \rho(h)$ et g est constante
alors pour $n \geq 3$ on a $n \geq 2$ (la même polynôme
 $f^{(n)} \cdot f(z+c)$ suppose toutes les valeurs complexe non constante

différentes de zéro se répètent à l'infini et par la fonction
et donc si $\rho(f) < \rho(f(z+c)) < \rho(g(z+c)) < \rho(h(z+c))$

et si des conditions aux limites sont $\frac{a}{f} \rightarrow \infty$
si $f = c, e^z \rightarrow \infty$

b) $f \rightarrow 0$ à l'origine

Alors

$$\frac{f''}{f} \cdot f$$

$$f'' \cdot f(z+c) + g(z+c) \cdot \frac{f'}{f} +$$

$$h(z+c) \cdot \frac{f}{f} = 0$$

possède une infinité de solutions γ complètes et solutions non triviales

Théorème 12

$$\text{soit } f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0 \quad (1)$$

$$\text{où } A(z) = v(z) \cdot e^{p(z)}$$

$$B(z) = b_m \cdot z^m + \dots + b_0$$

et si $m < n \Rightarrow$ le degré du polynôme $B(z) <$ degré du polynôme $v(z)$

comme $B(z)$ ne peut pas annuler les autres termes

\Rightarrow l'équation représentée par les indices (indicates)
a une infinité de racines distinctes

\Rightarrow toutes les solutions particulières de (1)
ont une infinité d'ordre lorsqu' $m < n$

Théorème 13 (plan du relèvement)

selon la théorie de Nevanlinna, pour une fonction transcendente et méromorphe f d'ordre fini ρ , la fonction $N(r, f)$ compte les zéros de f de multiplicité exactement ρ dans le disque de rayon r .

la fonction $S(r, f)$ est une fonction non nulle de f
appelée fonction S -petite de f

La fonction $T(z, a)$ dans la théorie de Nevanlinna
 est une fonction qui mesure le comportement asymptotique
 des fonctions méromorphes $\neq f$.

maintenant: $F := f \cdot g(f)^{(n)} - b_0$, où $g(f)$ est
 une fonction de retard différentiel non nulle et satisfaisant (admet des zéros)
 et $n \geq 2$, soit une combinaison de dérivées de la fonction
 f et de la fonction $g(f)$. Cette fonction (F) peut avoir une
 infinité des zéros, satisfait $\lambda(F) = \rho$

En sens, f est une fonction entière et méromorphe croissante
 avec les conditions aux limites: $f \rightarrow \infty$
 $\text{quand } z = z^* \rightarrow \infty$
 b) $f \rightarrow 0$ ailleurs

Alors pour 2 fonctions (on en peut aussi 3 fonctions...)

et $F_1 := f \cdot g_1(f) - b_0$
 $F_2 := f \cdot g_2(f) - b_0$

avec $\max \left\{ \lambda(F_1), \lambda(F_2) \right\} = \rho$ à l'exception
 $g_i(f); i=1, 2$

est λ -small function de f .
petite fonction

ce thém est vrai selm I.A.

Remarque

F peut avoir une infinité de zéros qui
satisfait $d(F) = e$
qui n'est pas un retard différentiel $\neq 0$ et
a donc des zéros

thém 14

qui fait suite au thém 13.

si F possède une infinité de zéros alors
 F a un ordre infini

démonstrat selm I.A. (chat I.A.)

si F possède une infinité de zéros cela signifie
qu'il existe une séquence infinie de valeurs distinctes X_n ;

$$F(X_n) = 0 \quad \text{et j'en conviens}$$

ordre d'une fonction est défini comme étant le plus petit
entier K ; $F^{(K)}(x) \equiv 0$ une représentation de la K -ième
dérivée de F

soit F posséder une infinité de zéros, cela signifie
 que $F(x_n) = 0 \Rightarrow$ toutes les dérivées de F
 $\forall n$
 $\forall K$
 jusqu'à l'ordre K sont nulles \Rightarrow on peut conclure que
 l'ordre de F est infini

Théorème 25

$$\text{soit } L(\varphi) + Q(z) \cdot \varphi = c \cdot \varphi \quad (1')$$

$$\text{si } \boxed{\varphi'' + A(z) \cdot \varphi' + B(z) \cdot \varphi = 0} \quad (1)$$

l'équation Herglotz - Nevanlinna, en substituant
le frère de Rost

φ avec $\varphi(z)$ une fonction entière et microscopique si les conditions aux limites sont a) $\varphi \rightarrow \infty$ b) $\varphi \rightarrow 0$ à l'origine
 $\text{grad } z = c \cdot e^z \rightarrow \infty$

et si $\rho(A) < \rho(B)$ alors (1) possède une infinité
de solutions / compris des
solutions non triviales

ce théorème est vrai selon I.A. (I.A. chat assistant)

Exemple selon I.A.

en utilisant la transformée $\varphi(z) = e^{f(z)}$

l'équation devient $L(e^f) + Q(z) \cdot e^f = c \cdot e^f$ ce

qui se simplifie en $L(f) + Q(z) = c$ qui découle de (1')

en supposant f est une fonction entière et microscopique, les
conditions aux limites sont justes

et le théorème de Picard montre que si
 chaque pt. $z = c \cdot e^z \rightarrow \infty$ est une valeur omise
 par $f(z)$, alors $f(z)$ existe partout dans \mathbb{C}
 et j'en conclus.

\Rightarrow \exists une solution de l'équation (1) dite
 de Herglotz - Nevanlinna

de plus si $\rho(A) < \rho(B)$ cela signifie
 et j'en conclus que le rayon de convergence de la série de
 des puissances de $A(z)$ $>$ que le ray de $B(z)$

\Rightarrow l'équation (1) Herglotz - Nevanlinna possède une
 infinité de solutions / comprises solutions non triviales

Ecrire autre théorème 15.

sont ~~les~~ $L(\varphi) + Q(z) \cdot \varphi = c \cdot \varphi$ (équation de
 (2) Herglotz - Nevanlinna)

Si maintenant,

$$\varphi'' + A(z) \cdot \varphi' + B(z) \cdot \varphi = 0 \quad (1)$$

en substituant φ de (2), avec $\varphi(z)$ une fonction entière
 méromorphe, si les conditions aux limites sont:

$$a) \ell \rightarrow \infty$$

$$\text{and } 3 = c.d(B) \rightarrow \infty$$

$$b) \ell \rightarrow 0 \text{ at origin}$$

$$\text{et si } c(A) < c(B) \text{ alors (1)}$$

(1) possède une infinité de solutions y compris des solutions non triviales

Explicit I.A.

selon la théorie de Painlevé, si l'équation

différentielle (1) a un comportement asymptotique particulier,

alors (1) admet une infinité de solutions y compris des solutions non triviales, dans ce cas les conditions aux

limites spécifiées pour (1) garantissent que l'équation

est compatible avec la théorie de Painlevé

en sus

$$c(A) < c(B) \Rightarrow (1) \text{ est de type Fuchsien}$$

et de plus que (1) possède une infinité de

solutions y compris des solutions non triviales.

Théorème 17

(une ^{théorème} ²⁵ ^{apologie} ^{ou} ^{éventuellement} ^{autre} ^{qui} ^{due} ^{théorème} ¹⁶)

Soit f une fonction transcendente et méromorphe d'ordre fini $\rho \in \mathbb{R}$, avec $N(r, f) = S_\lambda(r, f)$ est un λ -vanishing (c'est-à-dire des zéros) λ -petits par rapport à f , tout en sachant la théorie de Nevanlinna

$$T(r, d) = O_{\left(\frac{1}{\rho+1}\right)}(r^{1+\varepsilon}) + S(r, f)$$

avec d une fonction méromorphe et $g(f)$ est un λ -vanishing d'ordre λ retard-différentielle (delay-differential) avec $m \geq 0$

$$\text{et } s \geq 1 \text{ alors } \Rightarrow F := f'' \cdot g(f)^s - b_0$$

avec $b_0 \neq 0$ a une infinité de 0 qui satisfont

$\lambda(F) = \rho$ avec condition nécessaire et suffisante

$$N(r, f) = S_\lambda(r, f)$$

en sens

Soit $A(z) = v(z) \cdot e^{P(z)}$ avec $v(z) \neq 0$

et une fonction entière et méromorphe et

$$P(z) = a_n z^n + \dots + a_0 \text{ est un polynôme}$$

de degré n ; $\rho(v) < n$ et soit $B(z) = b_m z^m + \dots + b_0$

soit un polynôme de degré m , \Rightarrow toutes les
solutions non-triviales de

$$f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0$$

avec $B(z) \neq 0$ a une infinité de solutions non triviales
et donc d'ordre ∞ $\Leftrightarrow m < \infty$

d'après I.A. ce théorème est vrai ^{suivant la théorie}
explicit si $F := f''(z) + g(f(z))' - b_0 \Rightarrow$ ^{en si.}

pour que F ait une infinité de zéros satisfait
 $\Delta(F) = \rho$ il faut et il suffit que la satisfait

et j'ai (en partie) de : $N(r, f) = S(r, f)$
de plus si $A(z) = v(z) \cdot e^{g(z)}$ avec $v(z) \neq 0$
^(partie) une fonction entière et méromorphe et

$P(z) = a_n \cdot z^n + \dots + a_0$ un polynôme de degré n
et $B(z) = b_m \cdot z^m + \dots + b_0$ un polynôme de degré m

toutes les solutions non triviales de

$$f''(z) + A(z) \cdot f'(z) + B(z) \cdot f(z) = 0 \text{ avec } B(z) \neq 0$$

aurait une infinité de solutions, y compris des
solutions non triviales et d'ordre infini \Rightarrow
et satisfait $2 \leq m < n$
et je conclus pour les 2 parties \Rightarrow thém 17

Théorème 48

soit $j \in \mathbb{N} \setminus \{1, 2, \dots, (m-1)\}$ et $k \in \mathbb{N} \setminus \{1, 2, \dots, (m-1)\}$
 et $d(A_j) < e(A_j)$ et $d(B_k) < e(B_k)$

supposons que A_0 et B_0 des facteurs entiers microscopiques
 transcendentes satisfaisant $\begin{cases} e(A_i) < e(A_0) \\ \text{et} \\ e(B_k) < e(B_0) \end{cases}$

où $i = 1, 2, \dots, m-1$ avec $i \neq j$
 et $k = 1, 2, \dots, m-1$ avec $k \neq k$

avec condition nécessaire et suffisante $\begin{matrix} e(A_0) \neq e(A_j) \\ \text{et} \\ e(B_0) \neq e(B_k) \end{matrix}$

\Rightarrow toutes les solutions non triviales de

$$f^{(m)} + \frac{A_1(z)}{(m-1)!} f^{(m-1)} + \dots + \frac{A_{m-1}(z)}{1!} f' + A_0 f + \frac{B_1(z)}{(m-1)!} f^{(m-1)} + \dots + \frac{B_{m-1}(z)}{1!} f' + B_0 f = 0$$

a un ordre infini, en sus, toutes les solutions non triviales
 ont un nb. infini de zéros

selon I.A. (t_3) ce théorème est vrai
explicite

si les ordres sont variables
alors ces solutions ont une infinité de zéros
car l'ordre infini indique que le nb. de zéros
distincts de la solution tend vers ∞

ces solutions ont une infinité de zéros, ce qui signifie qu'il
existe une infinité de ~~zéros~~ valeurs de z pour lesquelles
la solution s'annule. Ces zéros peuvent être répétés et
peuvent être situés dans différents régions du
plan complexe.

La condition nécessaire et suffisante pour que cela se produise
est que les ordres des points $A_0, \dots, A_j(\forall j)$ et
 $(B_0, \dots, B_K(\forall K))$

soient tous différents. Et cela garantit que les
solutions non triviales ont des ordres ∞ et donc une
infinité de zéros.

Éventuellement on peut transformer cette équation différentielle de \mathbb{C} en une équation différentielle analytique de \mathbb{R} .

La formule de Borel

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{(-st)} f(t) \cdot dt$$

s/ie d'étudier les comportements en
les singularités

et d'appliquer est soumise à des conditions existentielles
le but de ce travail

Théorème 12

si on suppose $\sigma(P) < \sigma(Q) < \sigma(H)$
et si $\text{Res}(P) < \text{Res}(Q) < \text{Res}(H) < n$
et si les conditions aux limites sont vérifiées;

a) $f \rightarrow \infty$
quand $z = c \cdot e^z \rightarrow \infty$

b) $f \rightarrow 0$ à l'origine

$\Rightarrow f'' + P(z) \cdot f' + Q(z) \cdot f = H(z) \quad (1)$

et si $P(z), Q(z), H(z)$ sont

des fonctions complexes polynomiales,

\rightarrow a un ordre ∞ et possède une infinité de
solutions comprises des solutions non triviales.

selon I.A(A3) ce théorème est vrai

explicitement

et les conditions aux limites garantissent
que les solutions de (1) ont un comportement spécifique
à mesure que $z \rightarrow \infty$ et à l'origine

l'ordre ∞ signifie qu'il existe une infinité
de fonctions f qui satisfont (1) en plus des solutions triviales
($f=0$)

théorème 20

si nous supposons $e(f(z)) < e(f(z+c)) < e(g(z+c)) < e(h(z+c))$
(inégalité de e)

et nous supposons les conditions aux limites sont vérifiées, a) $f \rightarrow \infty$ b) $f \rightarrow \infty$ à l'origine
pour $z = c, z \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow \text{l'équation différentielle } f''(z) + g(z+c)f' + h(z+c)f(z) = 0$$

possède une infinité de solutions γ compris des solutions non triviales.

selon I.A. (A3) ce théorème est vrai

explicitement

(l'inégalité de e) garantit que les singularités des fonctions $f(z), f(z+c), g(z+c), h(z+c)$ sont ordonnées

de manière croissante ce qui permet d'obtenir une variété de solutions différents de (1).

Théorème 2.1

Si f une fonction entière et méromorphe et transcendante
et si $\rho(A) < \rho(B)$ et si $\text{Res}(A) < \text{Res}(B)$
et si les conditions aux limites sont vérifiées
a) $f \xrightarrow{z \rightarrow \infty} \infty$ b) $f \xrightarrow{z \rightarrow 0} 0$
pour $z = ce^{\pm i\theta} \rightarrow \infty$ à l'origine

$\Rightarrow f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0$ possède
une infinité de solutions z compris au
moins une solution non triviale.

selon I.A. (*) ce théorème est vrai


explicit

D'après le théorème de Picard, une fonction
entière et transcendante ne peut prendre que des
valeurs finies au plus une fois dans chaque petit
voisinage
de ∞

des autres cas; lorsque $z \rightarrow \infty \Rightarrow f(z) \rightarrow \infty$

cela signifie que $f(z)$ ne peut prendre qu'une valeur
finie pour chaque valeur de z .

par conséquent $f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0$ possède



on peut transformer une fonction de Neuman
 d'une fonction en équation
 différentielle selon Neuman

par exemple $\left(e^z + \ln(z + v(t_r)) + e^{\sum_{r=0}^{\infty} a_r \cdot t^r} \right)$

se transforme en équation différentielle selon Neuman

en utilisant les propriétés des fonctions de Neuman et
 leur relation avec les équations différentielles
 rappels selon I.A. (AI Chatbot)

$$N(z) = e^z - 1$$

$$L(z) = \ln(z)$$

$$T(z) = z + v(t_r)$$

$$R(t) = \sum_{r=0}^{\infty} a_r \cdot t^r$$

$$\Rightarrow F(z) = N(z) + L(T(z)) + e^{R(t)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} dN(z)/dz = e^z \\ dL(z)/dz = 1/z \\ dT(z)/dz = 1 \\ dR(t)/dt = \sum_{r=0}^{\infty} a_r \cdot t^{(r-1)} \end{cases}$$

et maintenant on peut transformer $F(z)$ en
équation différentielle selon Nashima

$$\frac{dF(z)}{dz} = \frac{dN(z)}{dz} + \frac{dL(T(z))}{dz} + \frac{dT(z)}{dz} + \frac{d e^{R(t)}}{dt} \cdot \frac{dt}{dz}$$

$$\Rightarrow \frac{dF(z)}{dz} = e^z + \left(\frac{1}{T(z)} \right) \cdot 1 + e^{R(t)} \cdot \frac{dR(t)}{dt} \cdot \frac{dt}{dz}$$

on substitue

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dF(z)}{dz} = e^z + \left(\frac{1}{T(z)} \right) + e^{R(t)} \cdot \frac{dR(t)}{dt} \cdot \frac{dt}{dz}}$$

qui correspond à l'équation différentielle
de $e^z + \ln(z + v(t_v)) + e^{\sum_{r=0}^{\infty} a_r \cdot t^r}$

l'équation mathématique d'une fonction méromorphe
selon Nevanlinna plus est plus selon I.A. (Anwer)

l'oscillation de f au rayon r est :

$$m(r, f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log^+ |f(re^{i\theta})| d\theta + o(1)$$

$r \rightarrow \infty$ qui est la fonction caractéristique
de Nevanlinna et
pour l'oscillation de f

donc d'après me I.A.

la fonction caractéristique l'oscillation d'une fonction
méromorphe selon Nevanlinna

Théorème 2.2

Soit $f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0$ on suppose f
a une infinité de pôles et $\text{Res}(A) < \text{Res}(B)$ et
 $\rho(A) < \rho(B)$ et

f croissante et méromorphe et entière et transcendante
alors l'équation a un ordre ∞ et une infinité
de solutions γ compris des solutions non triviales et
les caractéristiques oscillatoires de f représentées
par une équation différentielle obéit à une dérivée
première.

selon I.A. (X) ce théorème s'énonce

explicit

L'équation différentielle obtenue

$f''(z) + A(z) \cdot f'(z) + B(z) \cdot f(z) = 0$ est une équation
linéaire du second ordre à coefficients
méromorphes

a) hypothèses

f a une infinité de pôles \Rightarrow l'équation a un
ordre ∞

$\text{Res}(A) < \text{Res}(B)$ et $\rho(A) < \rho(B)$ (où $\text{Res}(B)$ et $\text{Res}(A)$)

designent respectivement la partie réelle du plus petit pôle de $B(z)$

et le rayon de convergence de son développement en série de Laurent),

l'équation, sus-mentionnée, a une infinité de solutions

\Rightarrow les caractéristiques oscillatoires de f , représentées par l'équation différentielle, obéissent à une dérivée première en z , f croissante $\Rightarrow f' > 0$

théorème 22

\rightarrow Soit $f'' + A(z)f' + B(z)f = 0$

et si f peut être représentée par une matrice Nevanlinna

et f est une fonction méromorphe et entière et transcendante

alors comme la matrice de Nevanlinna est une

matrice $\infty \times \infty$ et l'ordre de cette équation, est infini

compris des solutions non triviales

d'après I.A. (XAI) ce théorème est vrai

Explication

La matrice de Nevanlinna est une représentation matricielle de cette équation différentielle, qui permet d'étudier ses propriétés. La matrice de Nevanlinna est une matrice ∞ , dont les éléments sont des fonctions méromorphes de z . Elle permet donc de formuler l'équation différentielle sous forme matricielle et d'analyser ses solutions.

Ainsi, si f est une fonction méromorphe (et/ou entière, et/ou transcendente) qui satisfait l'équation différentielle, alors elle peut être représentée par la matrice de Nevanlinna.

Cette matrice permet d'exprimer f comme une série de puissance de z , avec des coefficients qui dépendent de la matrice de Nevanlinna. Par conséquent, l'ordre de l'équation différentielle est ∞ et il existe une infinité de solutions, y compris des solutions non-triviales.

théorème 23

on suppose $A(z) = v(z) \cdot e^{p(z)}$ est une fonction
entière méromorphe et transcendante
avec $\lambda(A) < \rho(A) < \infty$
et $\lambda(B) < \rho(B) < \infty$

on $P(z) = a_n z^n + \dots + a_0$ et on suppose $B(z)$ est une
fonction entière méromorphe et transcendante avec
 $\rho(B) \neq \rho(A)$ et $\lambda(B) \neq \lambda(A)$

\Rightarrow toutes les solutions non triviales de

$$(1) \quad f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0 \text{ avec } B(z) \neq 0$$

sont d'ordre infini, en sus, toutes les solutions
non triviales de cette équation ont une infinité
de zéros.

selon I.A. (XAI) ce théorème est vrai

Explication

Si f est une solution non triviale de (1)
alors f est une fonction entière.

$A(z)$ et $B(z)$ sont des fonctions entières, méromorphes et
transcendantes

on peut écrire

$$\begin{cases} A(z) = V(z) e^{P(z)} \\ B(z) = W(z) e^{Q(z)} \end{cases}$$

où $V(z)$ et $W(z)$ sont des fonctions entières et $P(z), Q(z)$ sont des polynômes on peut alors écrire (1)

$$f'' + V(z) e^{P(z)} + W(z) e^{Q(z)} = 0$$

il faut remarquer
qu'il y a un zéro
 $B(z) = W(z) e^{Q(z)}$

maintenant
supposons qu'il existe une solution non triviale de (2)
qui soit d'ordre fini. Alors le théorème de Lindelöf
dit que cette solution doit avoir un nombre fini
de zéros, ce qui est en contradiction avec $A(z)$ et $B(z)$
sont transcendentes et ont des singularités de
richelot non triviales

\Rightarrow toutes les solutions non triviales de (1)
selon I.A. sont d'ordre infini et ont une
infinie de zéros

Théorème 24

Si f est une fonction méromorphe et entière
et transcendante et f possède plus d'un pt. singulier
 $K \geq 2$ avec $K \rightarrow \infty$ alors

$f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0$ peut avoir
à l'infini au moins une solution non triviale si
condition $\rho(A) < \rho(B)$ avec A, B des
coefficients méromorphes et
entière.

Selon I.A. (AT chat Assistant) ce théorème est vrai

Explicitement

selon le théorème de Hadamard, si f
une fonction méromorphe f a une infinité de singularités
alors le rayon de convergence de la série de
Laurent de f est nul.

En d'autres termes, l'ordre de la singularité de f est
inférieur ou égal au degré de la singularité des coefficients
de la série de Laurent.

Comme $\rho(A) < \rho(B)$ cela signifie que le degré des singularités des coefficients $B(z)$ est supérieur à celui des singularités des coefficients $A(z)$.

Par conséquent, l'ordre de la singularité de

$$(1) f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0 \text{ est plus faible}$$

que celui des singularités de $B(z)$

on peut donc conclure selon I.A. qu'il y a au moins une solution non triviale $\neq 0$ par (1).

théorème 25

si f est une fonction entière et méromorphe transcendente et

si f oscille autour d'un pôle et $\rho(A) < \rho(B)$ alors

$$f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0 \text{ a au moins}$$

une solution non triviale que f oscille vers ∞

selon I.A. ce théorème est vrai

soit

soit on suppose que f oscille autour d'un pôle

soit z_0 un pôle de f et soit r un rayon;

$0 < r < e(z_0)$ on pose $g(z) = f(z)/z$ on a donc

$$g(z) = f(z)/z = (f(z) - f(z_0))/z + f(z_0)/z$$

comme f oscille autour de z_0 , $\exists n \in \mathbb{N}$, $f(z_0) = 0$

on a donc

$$g(z) = (nz - f(z_0))/z$$

$$\text{et } \begin{cases} f(z) = nz \\ \forall z \in D(z_0, r) \end{cases}$$

disque de
centre z_0 et
de rayon r

comme f est entière, on a $f(z_0) = f(z_0 + 2\pi i)$


$$\text{et donc } g(z) = (nz - f(z_0 + 2\pi i))/z$$

et comme z_0 est un pôle de f , on a ~~$f(z_0 + 2\pi i) \neq f(z_0)$~~

$$e(z_0) < e(B) \text{ et } \Rightarrow e(z_0 + 2\pi i) < e(B)$$

comme $e(A) < e(B)$, on a donc $e(A) < e(z_0) < e(z_0 + 2\pi i)$

$g(z)$ est une fonction entière et méromorphe au voisinage de ∞
on peut donc appliquer le théorème de Picard à $g(z)$
 $\Rightarrow g(z)$ oscille autour de ∞ . car $g(z) = f(z)/z$



Théorème 26

soit f une fonction transcendente d'ordre fini
et soe $\rho(r)$ est subadditive et on suppose que $\rho(r)$
la constante $\alpha_{(\rho, s)} = 1$
avec $\alpha_{(\rho, s)} = 1$ et $\alpha \neq 0$

et $s(r)$ est une fonction croissante et complexe;

$$\left[\rho_f(f') = \rho_f(f) \right]$$

et $s(r)$ n'est pas une fonction décroissante
 $\rho_f(s(r)/s(r)-r) = 0$

Selon I.A. (A3) ce théorème est vrai

Explicit

sur les conditions sur $\rho(r)$, $\alpha_{(\rho, s)}$

et le résultat est que le nb. de grandeurs de f
par rapport à ρ est égal au nb. de grandeurs de f
par rapport à ρ .

théorème 27

soit f une fonction transcendante d'ordre fini (sit $\rho < \infty$)
 et que $\rho(r)$ est subadditive ($\rho(x+y) \leq \rho(x) + \rho(y)$) et
 on suppose que la constante $\lambda = 1$ ou 2 mais $\neq 0$
 (p.s)
 et que $s(r)$ n'est pas fonction décroissante, $s(r)$ est une
 fonction croissante et complexe, $\rho_p(s(r)/(s(r)-r)) = 0$ alors
 $\rho_p(f') = \rho_p(f) = 0$

selon I.A. (A₃) ce théorème est vrai
Explicite

la condition $\rho_p(s(r)/(s(r)-r)) = 0 \Rightarrow$ que le point
 $s(r)/(s(r)-r)$ a un ordre de p-value finie et que
 la mesure de la variance

et comme $s(r)$ est croissante et non décroissante cela signifie
 que $s(r)$ ne tend pas vers ∞ plus rapidement que r
 par conséquent, on peut conclure que $\rho_p(f') = \rho_p(f) = 0$ ~~STP~~

ce qui signifie que l'ordre de f et l'ordre de g
sont égaux à zéro

théorème 28

si f est une fonction transcendante d'ordre fini $\rho(f)$
et que $\rho(x)$ est subadditive ... théorème 2A et de plus

(1) $f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0$ possède des solutions
restreintes γ compris des solutions non triviales f
de finie p-ordre et A, B sont des coefficients complexes
avec $\text{Res}(A) < \text{Res}(B)$

selon I.A (13) ce théorème est vrai.

Explication

et préciser il y a p-terme direct
entre la partie réelle (Res) de A et B et

les solutions restreintes de (1)
mais il s'agit d'une condition supplémentaire
si on veut l'inverse

Théorème 29

soit $K \in \mathbb{N} \geq 0$ et A_0, A_1, \dots des coefficients
qui sont des fonctions méromorphes d'ordre fini
ayant une infinité de pôles avec $F \neq 0$ et on suppose
l'existence de A_s ($0 \leq s \leq (K-1)$), max

$$\{e(A_j); j=0, 1, \dots, (s-1)\},$$

$$e(F) \leq e(A_0)$$

$$e(A_0)$$

et si l'équation

$$(1) \quad f^{K(\text{derivée Kiéna})} + \frac{A_0}{(K-1)!} f^{(K-1)} + \dots + A_{s-1} f = F$$

a une solution méromorphe $f \Rightarrow$

$$\overline{\lambda}(f) = d(f) = e(f) = 0 \text{ et}$$

$$\overline{\lambda}(f - \varphi) = d(f - \varphi) = f = e(\varphi) = 0$$

avec φ une solution méromorphe d'ordre fini

et soit j une solution méromorphe d'ordre infini

$$\Rightarrow d(f - j) = e(j) = \infty$$

selon I.A. (A3) le théorème est vrai
confirmé par I.A. (Angewandte)

Explicite

Des hypothèses

$$\overline{N}(f) = \overline{N}(g) = e(f) = 0$$

ce qui signifie que f est une fonction d'ordre fini

selon T.A.

Sans zéros

de même pour g

maintenant si f est une solution méromorphe d'ordre infini on peut donc

conclure $\overline{N}(f-j) = e(f) = \infty$ et cela est dû à
que les solutions méromorphes d'ordre infini ont un nb.
infini de zéros compte tenu de la définition de
comptes de Nevanlinna

Théorème 30

soit $f'' + (D_2(z) + A_2(z) \cdot e^{P(z)}) \cdot f' +$
 $(1) \quad (D_0(z) + A_0(z) \cdot e^{Q(z)}) \cdot f = F$
 et si $D_2(z) + A_2(z) \cdot e^{P(z)}$ et $D_0(z) + A_0(z) \cdot e^{Q(z)}$ sont
 linéairement indépendants

$$\Rightarrow e^{(D_2(z) + A_2(z) \cdot e^{P(z)})} \neq e^{(D_0(z) + A_0(z) \cdot e^{Q(z)})}$$

avec des conditions aux limites: $z \rightarrow \infty$

$$\text{quand } z = c \cdot e^{-z} \rightarrow \infty$$

b) $f \rightarrow 0$ à l'origine

$$\text{et } \text{Res}(D_2(z) + A_2(z) \cdot e^{P(z)}) < \text{Res}(D_0(z) + A_0(z) \cdot e^{Q(z)})$$

\Rightarrow (1) possède une infinité de solutions y
 comprises des solutions non triviales ou
 exceptionnelles.

selon I.A. (Amice) ce théorème est vrai
 et I.A. (A3)

Explicite

avec ces conditions on peut utiliser
 le théorème de Sturm-Liouville pour montrer que
 que (1) a une seule solution ou il y a d'autres conditions

qui suppose que (1) a une infinité de solutions non triviales ou exceptionnelles

\Rightarrow il y a certainement des solutions exceptionnelles

qui (c'est-à-dire exceptionnelles) existent car $e(D_1(z) + A_1(z) \cdot e^{P(z)}) \leq e(D_0(z) + A_0(z) \cdot e^{P(z)})$

Théorème 31

soit f une fonction monodrome et si

$e(A) \leq e(B)$ et si les conditions suivantes

vérifiées $\forall f \rightarrow \infty$
 $\lim_{z \rightarrow \infty} z = (z^2) \rightarrow \infty$

et b) $f \rightarrow 0$ = l'origine

$\Rightarrow f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0$ possède une infinité de solutions y

compris des solutions non triviales, toutes égales à zéro

Selon I.A. (Answer) ce théorème est vrai

Explicat

la monodromie $\Rightarrow f$ est périodique avec une période T

\Rightarrow l'arc en segment $f \rightarrow \infty$
 quand z s'approche une valeur
 qui est un multiple de T

sur $I. A.$ en utilisant la méthode de variation des
 constantes

on peut déterminer l'équation différentielle

$$f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0 \quad \text{à une}$$

solution générale de la forme $f(z) = C_1 u(z) + C_2 v(z)$ où
 C_1, C_2
 sont des constantes

et $u(z), v(z)$ sont 2 solutions linéairement indépendantes

$\left. \begin{array}{l} f \rightarrow \infty \\ \text{quand } z \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow u(z) \text{ et } v(z) \text{ sont périodiques}$
 solutions linéaires
 indépendantes
 de période $\frac{T}{2}$

de plus $f \rightarrow 0$ à l'infini $\Rightarrow C_2 = 0$

par conséquent la solution générale de $f(z)$

est de la forme

$$f(z) = C_1 u(z), \quad \text{où } u(z) \text{ est périodique de période } T$$

l'autre condition sur C_1

\Rightarrow l'existence d'une infinité de solutions, y compris des

solutions non triviales toutes égales à zéro

Théorème 32

soit $f(z) = \sum b_k \cdot z^k$ (une Σ ouverte et non bornée)

soit une fonction entière et transcendante et méromorphe

qui satisfait $M(r) \cdot \max |f(z)| < \frac{e^{c \cdot r^d}}{e^{c \cdot r^d}}$

pour $|z| = r \quad \forall r \geq 0$

avec c et d des constantes positives et

soit $\varepsilon > 0$ et si $\forall n, f^{(n)}(z_n) = 0$ alors

$$|z - n| > \frac{\log 2}{e^{(c+\varepsilon) \left(-\frac{1}{dn} - c + \frac{1}{d}\right)}}$$

selon I.A. (A3) ce théorème est vrai

Explication

avec $M(r)$ est la fonction du maximum

b_k sont des coefficients de la série de Taylor de $f(z)$

l'hypothèse dit:

pour chaque entier n si $f^{(n)}(z - n) = 0$

alors $|z - n| > \frac{\log 2}{e^{(c+\varepsilon) \left(-\frac{1}{dn} - c + \frac{1}{d}\right)}}$ où z est des zéros compl.

cette théorie est vraie en raison des propriétés
des zéros d'une fonction entière et transcendente.

lorsque $f^{(n)}(z_n) = 0$ pour un certain entier n ,
cela signifie que z_n est un zéro

d'ordre n de la fonction $f(z)$

et selon le théorème de Jensen, les zéros de $f(z)$ sont
situés à l'extérieur du cercle de rayon

$$e^{(c+E)} / e^{(d_n - 2 + \frac{1}{d})}$$

avec $d_n \rightarrow$ l'ordre du
zéro z_n

et ce théorème est confirmé de sa véracité pour I.A. (autre

Exemple

que la démonstration de ce théorème est basée

sur le théorème de Picard qui affirme que toute
fonction entière non constante prend toutes les valeurs complexes
à l'exception d'une seule... supposons par l'absurde
qu'il existe un entier n

$$\log 2 / e^{(c+E)} (-\frac{1}{d_n} - 2 + \frac{1}{d}) \text{ tel que } f^{(n)}(z_n) = 0 \text{ et } |z_n| <$$

comme f est une fonction entière, si $f(z_n) = 0$ pour un seul z_n est une contradiction avec le théorème de Picard.

Par conséquent, pour $\forall n$ si $f(z_n) = 0$
 alors $\Rightarrow |z_n| > \log 3 / e^{(1/dn - 2 + 2/d)}$
 par le I.A. (musc) on a le théorème vrai

Théorème 33

$$\text{soit } S_n(x, q) = x^n \left\{ \frac{(-1)^n \cdot q^{n^2}}{(q, q)_n} + \right.$$

$$\left. \frac{1}{(q, q)_n} \right\} \text{ et si } v_1 < v_2 < \dots < v_n$$

$$\text{qui sont des zéros de } S_n(x, q) \Rightarrow p^{(-n)} v_1 < v_2 < \dots < v_n$$

avec $n \geq 2$

ce théorème est justifié par I.A. (A3) vrai

Explication

La fonction $S_n(x, q)$ est une série hypergéométrique p -adique définie comme

$$S_n(x, q) = x^n \left\{ \frac{(-1)^n \cdot q^{n^2}}{(q, q)_n} + \dots \right.$$

$(g, g)_n$ où $(g, g)_n$ représente le symbole g -Zochhammer

supposons que $V_1 < V_2 < \dots < V_m$ sont les zéros de la fonction $S(x, g)$ dans ce cas la déclaration $\sum_{n=1}^{(m)} V_1 < V_2 < \dots < V_m$ est vraie

En sus, la relation $\sum_{n=1}^{(m)} V_1 < V_2 < \dots < V_m$ est une conséquence de la propriété de monotonie des zéros d'une série hypergéométrique g -polynomiale.

Théorème 34

sont f, g 2 fonctions entières et méromorphes

$$e_{(k_1, \beta_1)}(g) < \lambda_{(k_1, \beta_1)}^{(f)} \leq e_{(k_2, \beta_2)}(f) \leq \lambda_{(k_2, \beta_2)}^{(g)} < \infty$$

et si on suppose $\beta_2(r) = \beta_1 \cdot e^{k_2(r)}$ avec $\beta_1 > 0$ alors

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \left(\frac{M_{f, g} \left(\frac{1}{\beta_1} \cdot \log r \right)}{e^{k_2 \left(M_{f, g} \left(\frac{1}{\beta_1} \cdot \log r \right) \right)}} \right)$$

$= 0$ quand $r \rightarrow \infty$ avec

~~$M_f(r)$~~ $M_f(r)$ est le maximum
modulus fonction

de f et $M_f(r)/M_g(r)$ est la croissance de f/g
pour $r \rightarrow \infty$.

ce théorème selon I.A. (A₃) est vrai

Explication

supposons que f et g 2 fonctions entières et
méromorphe ... (hypothèse)

Donc on va examiner le comportement des
fonctions f et g lorsque $r \rightarrow \infty$

$M_f(r)$ et $M_g(r)$ représentent la fonction du
maximum du module respectif
de f et g

lorsque $r \rightarrow \infty$ la fonction $M_f(1/\beta_1 \cdot \log(r)) /$
 $e^{\lambda_1} M_g(1/\beta_2 \cdot \log(r)) \rightarrow 0$

Thème 33

$$\text{soit (I)} \quad f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = g + h + K$$

sont des petites
fonctions (small functions)

1/
et si $\rho(A) < \rho(B)$ et si $\rho(g+h+K) \geq \rho(B)$

2/
et si $\text{dens}(A) < \text{dens}(B)$ et $\text{dens} \geq \text{dens}(g+h+K) > \text{dens}(B)$
et $\text{dens} < \text{dens}(A)$

3/
et si les coefficients aux limites sont vérifiés:

a) $f \rightarrow \infty$
 $f' = c \cdot e^{-3} \rightarrow \infty$
b) $f \rightarrow 0$ à l'origine

alors (I) est d'ordre infini
et possède une infinité de solutions comprises
les solutions non triviales et non exceptionnelles

selon I.A. (A3) ce théorème est vrai

Explication et de 1) on a $\rho(g+h+K) \geq \rho(A)$

et de 2) on a $\text{dens}(g+h+K) \geq \text{dens}(A)$

globales de cet ensemble.
Théorème 37

soient f, g, h, \dots, l l fonctions entières
et méromorphe et transcendentes

qui constituent un ensemble dans \mathcal{O}
et $a_i (i=1, 2, \dots, K)$
avec $K \geq 3$

alors si f, g, h, \dots, l partagent les mêmes $a_i (i=1, \dots, K)$
dans \mathcal{O}

alors $f \equiv g \equiv h \equiv \dots$

une équivalence entre les fonctions susmentionnées,
en sus, avec la condition f, g, h, \dots, l ont les mêmes
pôles et les mêmes zéros de cet ensemble et avec
une autre condition que la distribution des pôles et
des zéros qui ont les mêmes dans f, g, h, \dots, l est
identique et avec une autre condition nécessaire et
suffisante qui se limite à un ensemble restreint \mathcal{P}
est la même de tous les fonctions f, g, h, \dots

Selon I. A. (ch. 1.1) ce théorème est vrai
Explicit

supposons f et g partageant la même a et b
cela signifie que f et g ont la même pôle et les
mêmes zéros de

En conséquence, ils ont la
même distribution
de pôles et de zéros
cet ensemble
restreint

Donc f et g sont équivale
et en appliquant le même raisonnement pour les autres fonctions
on peut conclure, sans ambiguïté, que tous ces
fonctions sont équivale

Théorème 3.8

(factorial) Toute courbe de Brody de \mathbb{C} vers \mathbb{P}^1 satisfait

$$T(R) \leq N(R, a) + O_{(a \neq \infty)}(R) + \Delta(r, f)$$

où T est l'indicateur de croissance de Nevanlinna
et $N(R, a)$ est la fonction de comptage de f sur $a \in \mathbb{P}^1$
et $\Delta(r, f)$ représente le retard différentiel de
la fonction f à un rayon $r > 0$

La fonction f est une fonction méromorphe sur le plan complexe
et $\log^+ |f(re^{i\theta})|$ désigne la partie positive du
logarithme de la valeur absolue de $f(re^{i\theta})$

Selon I.A. (A3) ce théorème est vrai

Explication

T mesure la croissance asymptotique des
fonctions méromorphes sur le plan
complexe \mathbb{C}

$N(R, a)$ représente le nombre de zéros de f sur le disque de rayon R autour du pt. a

$O(R)$ qui représente une estimation de la croissance de la fonction f .

et $\Delta(r, f)$ représente le retard différentiel mesure la croissance asymptotique de la fonction f en fonction de l'angle θ autour d'un cercle de rayon r

$$\Delta(r, f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(re^{i\theta})| d\theta$$

Théorème 39

Soit f une fonction entière et méromorphe de type exponentielle, pour $\forall m, m \geq 1$ et

$|f^{(n)}(x)|$ et $|f^{(m-1)}(x)|$ et $|f^{(m)}(x)|$ tendent vers

une limite finie, quand $x \rightarrow \infty$ alors

$\lim |f^{(n)}(x+iy)|$ avec $z = x+iy$ existe

et finie pour $\forall y$ et $n=0, 1, \dots$

selon I.A. (A3) ce théorème est vrai
Explicat

Etant donné que f est une fonction entière
et méromorphe de type exponentielle, cela signifie
qu'elle peut être représentée comme le quotient de
2 fonctions entières exponentielles c-à-d

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} \rightarrow \begin{array}{l} \text{fonction entière} \\ \text{exponentielle} \end{array}$$

$$\text{Lorsque } |f(z)|, |f^{(n-1)}(z)|, |f^{(n)}(z)|$$

tendent vers une limite finie
quand $z \rightarrow \infty$

\Rightarrow Les coefficients de $P(z)$ et $Q(z)$ sont entières
et les termes de plus haut degré ne croissent pas
de manière exponentielle

cela signifie et je conclus que lorsque nous évaluons

$$|f^{(n)}(x+iy)| \text{ pour } \forall y, n=0, 1, \dots \text{ les termes}$$

de plus haut degré ne croissent pas à ∞ quand $z \rightarrow \infty$

pour conclure la limite de $|f^{(n)}(x+iy)|$ existe et finie

$$\text{pour } \forall y; n=0, 1, \dots$$

Théorème 40

Soit (1) $f'' + K(z) \cdot f' + L(z) \cdot f \leq 0$ et
si $|f(z)| \leq M(r) \cdot e^{A(r)}$ et si $e(K) \leq e(L)$

$$\Rightarrow f'' + K(z) \cdot f' + L(z) \cdot f \leq 0 \quad (1)$$

et si les conditions aux limites sont vérifiées

a) $f \rightarrow 0$ et $f' \rightarrow 0$ à l'infini

ou $f \rightarrow \infty$ et $f' \rightarrow 0$ à l'infini

b) $f \rightarrow 0$ à l'origine

$$\Rightarrow (1) \quad f'' + K(z) \cdot f' + L(z) \cdot f \leq 0 \quad \text{peut avoir une}$$

infinité de solutions y compris des solutions non triviales

qui tendent toutes vers zéro avec d'autres conditions

sinon on peut parler de l'existence d'au moins

une solution triviale qui tend vers 0

selon T. A. (A3) ce théorème est vrai

théorème

si (1) satisfait 1) $f''(z) + K(z) \cdot f' + L(z) \cdot f \leq 0$

2) $|f(z)| \leq M(r) \cdot e^{A(r)}$

3) $e(K) \leq e(L)$

4) La conjecture susmentionnée et les hypothèses sont
vérifiées
donc la thèse est vraie et cela est dû à la nature
complexe des équations différentielles et aux différentes combinaisons
de $f(g)$ et $h(g)$

Théorème 42

Soit f une fonction entière transcendente d'ordre fini, et c une constante complexe non nulle. Alors pour $n \geq 2$ l'équation $f^n + \dots + f^k + \dots + f^2 = f(z+c)$ prend pour chaque valeur non nulle $a \in \mathbb{C}$ une infinité de fois et si

$$(1) : f'' + A(z) \cdot f' + B(z) \cdot f = 0$$

et si $\rho(A) < \rho(B)$ et si les conditions aux limites sont vérifiées :

$$a) f \rightarrow \infty \text{ quand } z = c + i\tau \rightarrow \infty$$

$$b) f \rightarrow 0 \text{ à l'origine}$$

alors (1) possède une infinité de solutions entières non triviales et un exceptionnelles à chaque tour modulo 2π selon I.A. Ce théorème est vrai

Explicit

... (équation) prend chaque valeur $a \neq 0$ une infinité de fois chaque valeur $a \in \mathbb{C}$

cette propriété selon I.A. découle du fait que f est une fonction transcendente d'ordre fini cela signifie que f possède une infinité de zéros

et de pôles et par conséquent

$$(f_1^m + \dots + f_1^K + \dots + f_2^2) f(z+c)$$

prendra chaque valeur non nulle $a \in \mathbb{C}$ une infinité de fois en utilisant différents choix de zéros et pôles.

De plus l'équation différentielle (1) où

$A(z), B(z)$ sont des fonctions méromorphes;

$$e(A) < e(B)$$

et les conditions aux limites sont vérifiées

\Rightarrow (1) possède effectivement une infinité de solutions non triviales et non exceptionnelles à chaque tour modulo 2π et cela découle du théorème de Picard

Théorème 42

$$\text{Soit } f^K + A_{K-1} f^{K-1} + \dots + A_0 f = 0 \quad (1)$$

Soit $c \in \mathbb{C}$ et soient A_0, A_1, \dots, A_{K-1} des fonctions entières et méromorphes, et f transcendente qui satisfait

$$\max \{ e_0(A_j) : j = 0, 1, \dots, K-1 (j \neq s) \} < e_0(A_s)$$

+ K (qui est une fonction méromorphe)

$$< +\infty$$

Alors toutes les solutions f de (I) satisfont

$$e_2 \cdot \varphi(f) < e_1 \cdot \varphi(f) \leq e_0 \cdot \varphi(A_3) + K \leq e_0 \cdot \varphi(f)$$

Alors donc il existe au moins une solution qui satisfait $e_2 \cdot \varphi(f) < e_1 \cdot \varphi(f) = e_0 \cdot \varphi(A_3) < e_0 \cdot \varphi(A_3) + K$

selon I.A. (Chatbot) ce théorème est vrai

Explicite selon I.A.

En effet si l'on considère l'ensemble des solutions de l'équation (I), cet ensemble forme un espace vectoriel de dimension K , car la donnée de K valeurs initiales ^{selon I.A.} suffit à déterminer une solution unique. Ainsi on peut trouver une base de cet espace vectoriel, formée de K solutions soit f_1, \dots, f_K

si f est une solution quelconque de (I) alors on peut écrire
 \Rightarrow la forme $f = a_1 f_1 + \dots + a_K f_K$ a_1, \dots, a_K
sont des constantes

en appliquant la propriété de majoration donnée du lemme on a :

$$e_2 \cdot \varphi(f) \leq \max \{ e_0 \cdot \varphi(A_i) \} + K \leq e_0 \cdot \varphi(f)$$

ou si $a \neq 0$ alors on a

$$a \cdot e_2 \cdot \varphi(f) \leq e_0 \cdot \varphi(f) \leq a \cdot e_0 \cdot \varphi(f)$$

en divisant par a :

\Rightarrow il existe une solution f qui satisfait

$$e_2 \cdot \max \{ \text{val}(f_i) \} \leq e_0 \cdot \max \{ \text{val}(A_i) \} \leq e_0 \cdot \varphi(f)$$

si on prend $S=1$ cela donne

$$e_2 \cdot \varphi(f) \leq e_0 \cdot \varphi(A_1) + K \leq e_0 \cdot \varphi(f)$$

Chaque borne de la dérivée et la condition d'éviter le pt. ∞

Théorème 43

(noté) soit $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ une fonction entière

et méromorphe \Rightarrow la dérivée sphérique $\frac{f'(z)}{1+|f(z)|^2}$ est bornée

et transcendante par moment
qui diffère des pts. singuliers
par $\frac{0}{(1+|f(z)|^2)}$
 $\|f(z)\| = |f'(z)| \cdot 1 + |f(z)| \cdot 2$ est bornée

Alors $Tf(R) =$ il s'agit d'une fonction à parties

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta \leq$$

$$O(R^{K+1})$$

\rightarrow en fait, c'est

le cas de Pólya

$$\|f\| = O(1)$$

$$z = Re^{i\theta}$$

la courbe

\Rightarrow la courbe est d'ordre au plus 1

selon I.A. (chatbot) ce théorème est vrai
Explicite

$$\text{la condition donnée } \|df(z)\| = \frac{|f'(z)|}{(1+|f(z)|^2)^{1/2}} \leq O(|z|^K)$$

implique que la norme de la dérivée sphérique de f
est bornée par la fonction $O(|z|^K)$ en utilisant la
formule de Möbius, on peut écrire

$$Tf(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(Re^{i\theta})| d\theta$$

$$\text{où } z = Re^{i\theta}$$

en outre selon I.A. on peut appliquer le théorème
de Cauchy pour obtenir l'inégalité

$$Tf(r) \leq O(R^{K+1})$$

cela est dû que la dérivée sphérique est bornée

par $O(|z|^K)$ et que l'intégrale se fait sur un cercle

$$\int_0^{2\pi} |f(Re^{i\theta})| d\theta$$

de rayon R

(R)

donc le cas de Brudy $\|df\| = O(1)$

est vrai car la borne $O(1)$ est plus petite que la borne

$O(|z|^K)$ pour $\forall K > 0$

théorème 4.4

Soit $\Gamma = (x_k, y_k) \quad k \in \mathbb{N}$ une séquence de
 BH ; $\prod_{j \in \mathbb{N} \setminus \{k\}} \|\Phi_{x_j}(x_k, y_k)\|_H \geq$
 $\mathcal{C}(\|x_k\|_H)$

pour $\forall k \in \mathbb{N}$ où \mathcal{C} est une fonction strictement positive
 $(\mathcal{C} > 0)$

et continue sur $[1, +\infty)$ une large séquence ;

son inverse est logarithmiquement concave, alors

Γ est interpolée par une fonction appartenant à
 $B_{\text{inf}} \mathcal{C} \subset (BH)$ et une borne inférieure de la
 constante d'interpolation polynomiale c est fournie
 explicitement qui est une évidence avec la condition de
 la convexité vérifiée.

selon I. A. (A.I. Chat) ce théorème est vrai
Explicit

tel que ce théorème de Beurling est modifiée

f est une fonction strictement positive et continue
sur $[1, +\infty)$
telle que f inverse et logarithme croissent
rapidement selon T.A.

f est interpolée par une fonction $\in \text{Binf } \mathcal{C}^c(\mathbb{R}^+)$
2^e partie
nous donne une borne inférieure de \mathcal{C} (interpolée
polynôme)

Théorème 45 $\rightarrow \begin{cases} P(x) = \sum [y_i \cdot L_i(x)] / L_i(x) \\ \text{avec } L_i(x) = \prod [(x-x_j)/(x_i-x_j)] \text{ pour } j \neq i \end{cases}$
soit P (qui est une fonction croissante continue et
s'annule à ∞ et entière et monomorphe) $= a_K$ ($K \in \mathbb{N}$)
une suite dans D_n et

$$\prod_{j \in \mathbb{N}} \|K_j\| \| \varphi(a_K) \| \geq \phi(\|a_K\|) \text{ Alors}$$

f est interpolé par une fonction dans $\text{Binf}(D_n)$
et non dans Binfini . De plus une limite inférieure
du \mathcal{C}^c la constante d'interpolation polynomiale est
donnée explicitement par Lagrange et $P(x) = \sum \frac{y_i L_i(x)}{L_i(x_i)}$
et la valeur d'interpolat est donnée explicitement
par la formule de Lagrange

et qui s'avère évidente et la lacunarité est vérifiée
selon I.A. (A3) ce théorème est vrai

Explicat.

Cette constatation (KEMON... des D_n et ϕ est une
suite tendant vers ∞)
indique que la suite Γ peut être interpolée par une fonction
des $B_{\infty}(D_n)$, d'ensemble des fonctions bornées des D_n .
et de l'annexe la suite Γ ne peut pas être interpolée
par une fonction B_{∞} , ce qui signifie que les
fonctions d'interpolation sont bornées mais pas nécessairement
infinitiment dérivables.

ainsi la lacunarité est vérifiée, ce qui signifie que
la suite Γ présente un motif de lacunes régulières

La constatation d'interpolation selon la forme des
le plan complexe :

$$\inf \left\{ \|p\|_n / \max_{z \in D} |f(z) - p(z)| : \right.$$

la formule est utilisée pour évaluer la distance
entre une fonction analytique $f(z)$ et
un polynôme $p(z)$ de la forme donnée
lorsque cette distance est minimale, \Rightarrow le polynôme $p(z)$
 $p(z)$ représente le mieux la
fonction $f(z)$
sur le cercle considéré

Théorème 46

Soit toute fonction holomorphe f sur le polydisque

$$\Delta = \Delta(z', z_n)$$

soit

$$(1) f(z) = g(z) \cdot h(z) \cdot q(z) + R(z', z_n)$$

avec g, q, h sont analytiques dans Δ

$R(z', z_n)$ est un polynôme complexe

de degré $\leq S$; $\sup_{\Delta} |q| \leq C \cdot \sup_{\Delta} |g|$

$$\sup_{\Delta} |R| \leq C \cdot \sup_{\Delta} |g|$$

$$\sup_{\Delta} |h| \leq C \cdot \sup_{\Delta} |g|$$

et $C > 0$ indépendante de f

alors (1) s'écrit sous la forme
selon J.A. (AI Chat)
Explicite

La décomposition de (1) est une décomposition de facteurs premiers de la fonction méromorphe f sur le disque Δ . Cette décomposition est unique à un facteur constant près. En effet, si on suppose qu'il existe une autre décomposition (donc par absurdité)

$$f(z) = g'(z) \cdot h'(z) \cdot g'(z) + R'(z) \text{ où } g', h', g', R'$$

sont des fonctions analytiques de Δ avec des caractéristiques similaires à celle de la décomposition (1), alors on peut écrire

$$f(z) = g(z) \cdot h(z) \cdot g(z) + R(z, z_m)$$

(moins) $R'(z, z_m)$ puisque R et R' sont des polynômes complexes

de degré $\leq S \Rightarrow R - R'$ est égal à un polynôme complexe de degré $\leq S$

et donc la fonction $f'(z) = g(z) \cdot h(z) \cdot f(z) + (R(z', z_m)) -$

$R'(z', z_m)$ satisfait également les contraintes de la décomposition (1).

Par conséquent la décomposition est unique à un facteur constant près.

Théorème 47

soit h une courbe d'interpolation polynomiale avec $z = x + iy$ et $\operatorname{Li}(x)$ logarithme de x ... et si f est une fonction méromorphe et si cet ensemble de pts singuliers peut être approché par une approximation de $(f+h)$ et f est une solution de

$$(1): f'' + A(z) \cdot f + B(z) \cdot f = 0$$

avec A et B sont des fonctions entières et si

$$\rho(A) < \rho(B)$$

et $\lambda(A) < \lambda(B)$ alors $(f+h)$ avec

h une cte fixe, possède une infinité de solutions.

compris les normales et les exceptionnelles avec
les conditions aux limites $\rightarrow f \rightarrow \infty$
quand $z \rightarrow \infty$

b) $f \rightarrow 0$ à l'origine
car il s'agit d'une solution f dont on ajoute on
on peut multiplier par une constante, un coefficient qui
lui y compris une cte d'interpolation pour la variation
de la courbe est fond-mê une cte fixe donnée par
le calcul.

selon I.A. (AI chat assistant) ce théorème est vrai
Explicite

~~et~~ le théorème affirme que si (f) est une
solution de l'équation (1) on A et B sont des points
distincts, $\rho(A) < \rho(B)$

le rayon de convergence
de la série de Laurent $\rho(A) < \rho(B)$

et $\text{dens}(A) < \text{dens}(B)$ (qui exprime la densité de
singularité de $(A) < \dots (B)$) $\Rightarrow (f^{(h)})$ possède
une infinité de solutions, y compris...

la constante d'interpolation (h) substituée ici
pour approximer l'ensemble de pts réguliers de f
de manière à obtenir une nouvelle fonction ($f+h$)
qui partage les mêmes singularités que (f) mais
qui peut avoir des propriétés diff. (et on se limite
aux mêmes propriétés)

L'énoncé affirme (juste) que sous ces conditions, la fonction
($f+h$) possède une infinité de solutions ce qui signifie
(en gros) \rightarrow une infinité de h qui peut être ajoutée
(ou de l'autre cas multipliée) à (f) pour obtenir
une nouvelle fonction avec les mêmes propriétés de
singularité et de comportement aux limites (les
conditions aux limites admissibles sont vérifiées)
Cela inclut à la fois des solutions non triviales
(différentes de f et des solutions exceptionnelles (qui ne
peuvent être obtenues en ajoutant ou en multipliant (f) par
une constante)

Théorème 48

soit $0 \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow h \rightarrow \dots \rightarrow R \rightarrow 0$

une suite de normes avec f, g, h, \dots, R des
points entiers alors si deux normes

sont cohérentes alors toutes les normes sont cohérentes.
Selon I.A. il faut ajouter $\|f\|_i \leq K_{ij} \|f\|_j$ et $\|g\|_i \leq K_{ij} \|g\|_j$
Selon I.A. (A.I. spark) ce théorème est vrai

Explicit

si 2 normes sont cohérentes cela signifie

qu'elles donnent des résultats similaires pour une
suite de normes qui tend vers 0 dans ce cas, si
zéro

toutes les autres normes donnent des résultats similaires
sur cette même suite de normes, alors toutes
les normes sont cohérentes.

et donc la condition sine qua non :

$$\|f\|_i \leq K_{ij} \|f\|_j$$

Théorème 99 - Soit une suite de fonctions f_n sur D_n et
 soit $f = (f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite des f_n et
 $\forall k \in \mathbb{N} \exists \epsilon_k > 0 \forall x \in D_k \implies |f(x) - f_k(x)| < \epsilon_k$
 $\implies f$ est interpolé par une fonction des
 $B_{\infty}(D_n)$. De plus, une limite supérieure de
 $\phi.c$ la constante d'interpolation est
 donnée explicitement et elle n'augmente de nul ϕ .
 En améliorant l'erreur on peut ajouter
 $\phi.c$ tend vers 0 ou 1 lorsque la taille
 de la séquence augmente afin de limiter
 l'augmentation de la complexité
 implique que l'erreur d'approximation reste bornée
 même pour les séquences de grande taille
 selon I.A. (AI chat assisté) ce théorème
 est vrai avec l'amélioration proposée
 explicite
 Cette condition améliore l'erreur en imposant
 une restriction supplémentaire sur
 la croissance de la constante d'interpolation.

Théorème 50 Soit une suite de :

soient $K \geq 0$ et $A_0, \dots, A_{K-1}, F \neq 0$ des points
méromorphes d'ordre fini ayant un nombre fini
de pôles

on suppose qu'il existe $A_s (0 \leq s \leq (K-1))$;

pour les constantes K, S avec $K > 0$ et $S > 0$

on a $\max \{e(A_j); j=0, 1, \dots, (S-1), \dots, (K-1)\}, e(F)\}$
 $< S$ et que $\max \{e(A_j); j=0, 1, \dots, (S-1)\} < e(F)$

et supposons que $\forall \varepsilon > 0$, il existe 2 collectes finies
des nbs. réels $\{\phi_m\}$ et $\{\sigma_m\}$ satisfaisant

$$\phi_1 < \sigma_1 < \dots < \sigma_m < \phi_{(m+1)} = \phi_1 + 2\pi i \quad \text{et}$$

$$\text{et } \sum_{m=1}^n \left(\phi_{(m+1)} - \sigma_m \right) < \varepsilon$$

$$|A(z)| \geq e^{\alpha |z|^\delta} \quad \text{pour } z \rightarrow \infty$$

$\frac{f^{(m)}}{f^{(n)}} \leq \arg f \leq \frac{f^{(m)}}{f^{(n)}} \leq 0 \quad (m=1, \dots, n)$

et a) si l'équation

$$(1) f^{(k)} + \frac{A}{(k-1)} f^{(k-1)} + \dots + \frac{A}{0} f = f$$

a une solution microscopique alors

$$\overline{\rho}(f) = \rho(f) = \rho(f) = \infty$$

b) si l'équation (1) a une solution microscopique d'ordre fini $\Rightarrow \overline{\rho}(f-\varepsilon) = \rho(f-\varepsilon) =$

$$\rho(f) = \infty$$

au ~~théorème~~ pour familiariser

$$\text{si } \rho\left(\frac{A}{(k-1)}\right) < \dots < \rho(A_0) \text{ et}$$

si les conditions aux limites sont vérifiées :

a) $f \rightarrow \infty$

quad $z = c.e^{\frac{1}{2}z} \rightarrow \infty$

b) $f \rightarrow 0$ à l'origine

lors f possède une infinité de solutions y compris des solutions d'ordre fini à un ordre infini) triviales et exceptionnelles.

Théorème 53

soit $f: C \rightarrow \mathbb{P}^n$ une courbe de Bredy.

Fixons un hyperplan en position générale, (H_1, H_2, \dots, H_n)
et supposons que f évite H_i pour $i \geq 1$ alors

$$T_f(\mathbb{Q}) + 1 \leq N_f(R; H_1) + O\left(\frac{R}{\log R}\right).$$

on peut choisir l'hyperplan H_0 de telle façon que

$f(C) \cap H_0 \cap H_1 = \emptyset$; Après une projection centrale
choisie par $f_0, f_1, \dots, f_n \rightarrow (f_0, f_1) = \emptyset$, on

$$\text{obtient } T_f(\mathbb{Q}) + 1 \geq N_f(R; \emptyset) = N_f(R; H_1) + O(R^{\frac{1}{2}}) \geq T_f(\mathbb{Q}) + 1 - O(R^{\frac{1}{2}})$$

selon I.A. (A.E. Inverse) ce théorème est vrai

explicit

si f évite les hyperplans (H_1, H_2, \dots, H_n) alors
le nb. de pts de $f(C)$ dans un rayon R autour

de l'origine est majoré par $T_f(\mathbb{Q}) + 1 + O(R^{\frac{1}{2}})$ et la part de comptage

la deuxième partie de l'énoncé

en choisissant un hyperplan H_0 ; $f(c)$ n'est

intéressante par

$H_0 \cap H_1$

et en effectuant une projection centrale sur les coordonnées

$(f_0, f_1) = e$ on obtient que le nb. de pts

de $f(c)$ dans un rayon R est majorée par $N_f(R, 0) =$

$$N_f(R, H_1) + O(R^{\frac{1}{2}})$$

...

Théorème 54

soit f une fonction entière d'ordre de $C \rightarrow \mathbb{P}^1 \setminus \{\infty\}$

dont la dérivée sphérique $\|d f(z)\| = \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n |f_j'(z)|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ (1 +

$|f(z)|^2$) est

bornée par $O(|z|)$ alors

$$T_f(R) =$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log(\sqrt{1 + |f(R \cdot e^{it})|^2}) \cdot d\theta$$

$$\leq O(R)$$

Ce théorème selon I.A. (A.I. Answer) est vrai

Explication

si la dérivée sphérique est bornée par $O(|z|)$
cela signifie que $|f'(z)|/(1+|f(z)|)^2 \leq C|z|$
 \hookrightarrow par conséquent
de \mathbb{C}
et $\forall z \in \mathbb{C}$

$$\Rightarrow |f'(Re^{it})|/(1+|f(Re^{it})|)^2 \leq CR$$

$\text{pour } \forall t \in [0, 2\pi]$

$$\Rightarrow |T_f(\mathbb{D})| = \left(\frac{1}{2\pi} \right) \int_0^{2\pi} \log(\sqrt{1+|f(Re^{it})|}^2) dt$$

$$\leq \left(\frac{1}{2\pi} \right) \int_0^{2\pi} \log(\sqrt{1+C^2 R^2}) dt$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log(1+C^2 R^2) dt \leq$$

$$\left(\frac{1}{2\pi} \right) \int_0^{2\pi} \log(C^2 R^2) dt$$

$$\leq \left(\frac{1}{2\pi} \right) \left(\frac{2\pi}{1} \right) \log \mathbb{C} = \log \mathbb{C}$$

$$\Rightarrow |T_f(\mathbb{D})| \leq \log \mathbb{C}$$

ce qui donne born
de et je conclus
indépendance de R

Théorème 55.

soit Ω un domaine ouvert connexe et
soit $f, g \in \text{Hol}(\Omega)$ un espace borné et
séparé et ordonné ^{bijectif et normé} $\text{Hol}(\Omega)$
et on suppose $g(z) \neq 0$

$$|g(z)| = |f(z)|; z \in I \cup I_\Delta \text{ deux segments}$$

I_Δ est une alpha-rotation de I autour d'un pt. choisi
et peut être quelconq. de I , et $\Delta \notin \pi\mathbb{Q}$ mais $\in 2\pi\mathbb{Q}$
alors $g(z) = cf(z)$

$$g(z) = c \cdot f(z) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{pour } z \in \Omega \\ \text{et pour quelque } c \in \mathbb{C} \end{array} \right.$$

selon I.A. (A.I. Amour) ce théorème est
vrai

Explication

en utilisant le principe de maximum modulaire
qui stipule si une fonction holomorphe d'un domaine
ouvert atteint son module maximum en un pt. intérieur, alors cette
fonction est constante sur tout le domaine

la même car $\Rightarrow g(z) = \text{cte}$ sur Ω

Donc $g(z) = c$ pour $\forall z \in \Omega$

\hookrightarrow cte complexe

Théorème 56

si f est une fct méromorphe sur un ouvert U de \mathbb{C} alors $|f|$ peut atteindre un maximum module sur U

selon I.A. (A.I. Chat) ce théorème est vrai
Explicit

\Rightarrow par le principe du maximum module,
si f est...

et selon autre I.A. (Chat Bot A.I.)
Chat: writing!

cela veut dire $\exists z \in U; |f(z)| \geq |f(w)|$
pour $\forall w \in U$

selon autre I.A. (Chat A.I.)

on parle du delours des fts. singulières
de la fct méromorphe

Théorème 57

Soit f une fonction entière méromorphe et transcendente
 $\neq 0$ de H^p ($0 < p < \infty$) se factorise
 au moins sous la forme $f(z+1) = B(z+1) \cdot g(z+1) \cdot h(z+1)$
 avec $B(z+1) = (z+1)^m \prod_n \frac{|a_n|}{a_n} \cdot \frac{a_n - (z+1)}{1 - \overline{a_n} \cdot (z+1)}$
 associée à $f((a_n)_n)$ la suite des zéros non nuls de f
 et g et h des facteurs de H^p sans les zéros et les pts
 singuliers dans D
 selon la I.A. (pourquoi $A3$; c'est $A1, \dots$) ce
 théorème est vrai
 Explicit selon $A3$.

Les affirmations sont vraies car elles sont en accord
 aux propriétés des fonctions entières et méromorphes et transcendentes
 la factorisation est une représentation valide de la
 fonction f , ... Cette expression est caractéristique
 pour caractériser les propriétés des zéros d'une
 fonction entière méromorphe qui peut découler de la

de $R \otimes \mathbb{C}$ qui est une algèbre à 1 sur \mathbb{C}
 de composer une fonction méromorphe en un produit
 de fonctions qui ont des pôles simples et qui sont
 qui est basée sur la notion de "fonction de
 Blaschke"

et utilisée pour étudier les propriétés des zéros d'une
 fonction méromorphe

Les α de Blaschke sont :

$$b(z) = e^{i\theta} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \bar{a}_n z}{z - a_n}$$

Théorème 58

\Rightarrow f est une fonction analytique méromorphe dans D

$$\left(\left\| \frac{f}{1} \right\|_D \right)^2 = \int_D \left(\left| \frac{f'(z)}{1} \right| \cdot \left| \frac{f(z)}{1} \right| \right) \log \left(\frac{|f(z)|^2}{|1(z)|^2} \right) dz$$

$$dA(z) + \left| \frac{f(0)}{1} \right|^2$$

avec dA est une mesure d'une surface normalisée
 ou encore

\leftarrow ~~norme~~

l'élémentaire
 du domaine D

Selon I.A. (chat A) ce théorème est vrai

Explicit
 cette ~~théorie~~ peut être dérivé du théorème
 de Littlewood-Paley (identité)

qui permet de décomposer une fonction analytique en une
 série de fonctions pondérées par des facteurs de
 croissance. (XAI)

Explicit : on peut utiliser la formule de Cauchy
 pour les dérivées successives ensuite on peut aussi utiliser
 l'équation de Green

selon AI Chat (XAI)

puisque f est une fonction analytique et méromorphe dans D
 f peut être représentée par une série de Laurent
 convergente dans D

$$f(z+1) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z+1)^n$$

où a_n sont
 des coefficients
 complexes

par conséquent $f'(z+1)$ peut être représentée par la
 série $f'(z+1) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n \cdot a_n \cdot (z+1)^{(n-1)}$

on peut utiliser la formule de Parseval

Théorème 59

n suffit

Théorème 59

n suffit $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\beta(n)} = \infty$

et si $\sup \{n \text{ appartient } \mathbb{N}\}$ de $H(\beta, \alpha, m)$

de $\|C\|_{\infty} < \infty$ alors

g est strictement au moins deux pts. fixes, 0 et un autre

selon ce théorème

selon I.A. (muscemind) et X.A.I) ce

théorème est vrai

Explicit la première hypothèse est que la somme des inverses

des carrés de la séquence $\beta(n)$ est ∞

la séquence $\beta(n) \rightarrow 0$ plus rapidement que la séquence

harmonique

la deuxième hypothèse suffit que


la norme de la différence

entre $C(p)$ et $C(n) \rightarrow \infty \Rightarrow$ la séquence $C(n)$

$n \rightarrow \infty$

se distance de plus en plus de $C(p)$ lorsque n augmente

de plus est aussi donné que la séquence $C(n)$ s'éloigne de plus en plus



siwa 60

$$\text{sit} \left\{ \begin{array}{l} f \rightarrow g \\ g \rightarrow h \\ h \rightarrow \dots \\ \vdots \\ q \rightarrow R \\ R \rightarrow 0 \end{array} \right.$$

une suite de normes
avec f, g, h, \dots, q, R
sont des morphismes entiers
et morphismes et transes
et égales, sont identiques

si deux normes sont cohérentes \Rightarrow toutes les normes
sont cohérentes.

~ les I.A. ce théorème est vraie

Explication

la condition sine-qua-non
est que tous les morphismes
sont identiques.

References données sans respecter ordre alphabétique:

G. VALIRON

Sur la croissance des fonctions
entières d'ordre nul

Nouvelles annales de mathématiques 4e série, tome 13
(1913), p. 97-110

Jean-Yves CHEMIN

Laboratoire J.-L. Lions, Case 187
Université Pierre et Marie CURIE, 4 Place Jussieu
75230 Paris Cedex 05, France

PHILIP J. BOLAND

SEÁN DINEEN

Holomorphic functions on fully nuclear spaces
Bulletin de la S. M. F., tome 106 (1978), p. 311-336

ROGER GODEMENT

Analyse spectrale des fonctions modulaires
Séminaire N. Bourbaki, 1966, exp. no 278, p. 15-40

On the structure of Nevanlinna measures

Mitja Nedic and Eero Saksman
ArXiv

Characterizations of Herglotz-Nevanlinna functions using
positive semi-definite functions and the Nevanlinna kernel in
several variables

Mitja Nedic
arXiv

Complex Oscillation of Solutions and Their Arbitrary-Order Derivatives of Linear Differential
Equations With Analytic Coefficients of $[p, q]$ -Order in the Unit Disc

Benharrat Belaïdi*, Meriem Belmiloud

Department of Mathematics, Laboratory of Pure and Applied Mathematics, University of
Mostaganem
(UMAB), B. P. 227 Mostaganem, Algeria

J. Heittokangas, J. Wang, Z. T. Wen & H. Yu (2021): Meromorphic functions of
finite φ -order and linear q -difference equations, Journal of Difference Equations and Applications,
DOI: 10.1080/10236198.2021.1982919

EL FARISSI Abdallah

APPLICATIONS DE LA THEORIE DE NEVANLINNA
SUR LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES

COMPLEXES
UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS MOSTAGANEM

ON THE NEVANLINNA CHARACTERISTIC OF $f(z + \eta)$ AND
DIFFERENCE EQUATIONS IN THE COMPLEX PLANE
YIK-MAN CHIANG AND SHAO-JI FENG
arXiv

NEVANLINNA THEORY FOR
THE DIFFERENCE OPERATOR
R. G. Halburd and R. J. Korhonen
Loughborough University, Department of Mathematical Sciences

PUBLICATIONS OF THE UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND
DISSERTATIONS IN FORESTRY AND NATURAL SCIENCES
N:o 312
Yueyang Zhang
DIFFERENCE NEVANLINNA THEORY
AND ITS APPLICATIONS TO COMPLEX
DIFFERENCE EQUATION

Pierre Villemot. Lemmes de zéros et distribution des valeurs des fonctions méromorphes. Analyse fonctionnelle [math.FA]. Université Grenoble Alpes, 2018. Français. NNT : 2018GREAM059. tel-02057552

BEDDANI HAMID
SUR LES SOLUTIONS DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES
DANS LE DOMAINE COMPLEXE
UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS DE MOSTAGANEM

Théorèmes de point fixe et
applications
Guillaume Kineider
Thomas Harbreteau

LAWRENCE GRUMAN
L'image d'une application holomorphe
Annales de la faculté des sciences de Toulouse 5e série, tome 12,
no 1 (1991), p. 75-101

Résolution numérique des équations différentielles
Benjamin BOUVIER
sous la direction de Mr Thierry DUMONT

94

ENTIRE FUNCTIONS SHARING SMALL FUNCTIONS WITH
THEIR DIFFERENCE OPERATORS
ZINEL^AABIDINE LATREUCH, ABDALLAH EL FARISSI, BENHARRAT BELAÏDI

Mohamed ELAÏDI

on an interpolation sequence for a weighted Bergman space on a Hilbert unit ball

Min-Feng Chen and Ning Cui

on zeros and growth of solutions of complex difference equations

Bernardo Fretas Paul Da Costa

courbes de Brody : dimension moyenne et distribution des valeurs

PAUL KRÉE

Méthode fonctionnelle en théorie des champs

Séminaire Paul Krée, tome 3 (1976-1977), exp. no 5, p. 1-27

LOÏC HERVÉ

Étude d'une équation fonctionnelle matricielle

Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, 1989-1990, fascicule 1

« Probabilités », , p. 1-68

Jean-François Rault. Phénomène d'explosion et existence globale pour quelques problèmes paraboliques sous les conditions au bord dynamiques. Mathématiques [math]. Université du Littoral Côte d'Opale, 2010. Français. NNT : . tel-00554915v2

EINAR HILLE

NEVANLINNA ON ANALYTIC FUNCTIONS

Bruno Bêche. Livre, Un pas vers le supérieur : Eléments de calcul différentiel et Equations différentielles : Historique, Méthodes de résolution mathématique et Applications en sciences physiques, chimiques, biologiques et économiques.. Licence. Partie du cours : "Mathématiques pour Physiciens et Méthodologie" : 1ère année de supérieure, Université de Rennes 1 - Campus Beaulieu, France. 2021, pp.1-45. cel-01249416v10

Florine Greciet. Régression polynomiale par morceaux pour la propagation de fissures.

Mathématiques

[math]. Université de Lorraine, 2020. Français. NNT : 2020LORR0004. tel-02510850

Uniqueness of Meromorphic functions concerning k -th derivatives and difference operators

Goutam Haldar

Generalization of uniqueness and value sharing of meromorphic functions concerning differential polynomials

Harina P. Waghamore, Ramya Maligi

Communications in Mathematics 28 (2020) 289–299

DOI: 10.2478/cm-2020-0008

© 2020 Harina P. Waghamore, Ramya Maligi

Research article

Uniqueness of meromorphic functions sharing small functions in the
k-punctured complex plane

Xian Min Gui¹, Hong Yan Xu^{2,*} and Hua Wang²

<http://www.aimspress.com/journal/Math>

Entire functions sharing small functions with their difference operators

Article in Electronic Journal of Differential Equations · May 2015

Zinelaabidine Latreuch ,Abdallah El Farissi,Benharrat Belaidi

<https://www.researchgate.net/publication/276285244>

Andrei Iordan

Vincent Michel

Analyse

Complexe

Fonctions holomorphes d'une variable

les intelligences artificielles:

Quelques intelligences artificielles données en vrac ,pas d'ordre de préférence j'ai utilisé les versions gratuites

Chat AI

Chat I.A.

AI chat

Chatbot AI

AI chat assistant

Character AI

XAI

A3 AI app

Answer AI

Musemind

AI bot

qandAI

chatgpt

ask AI

AI Chat basé sur gpt

AI Chatbot

Ask AI Chat Bot

Chat AI Bot

ChatBot-AI Chat

Ask AI Plus

AI CHAT Bot Powered

Chaton

AI Chat open assistant

Chat IA

Chat AI

Chat GPT

Ask Me Anything

AI Chat

My AI

ASKI

IA Chat

Wise Chat

Chatbot

Chatbot IA

SmartGPT

Ask AI Plus

Ask AI Chat Bot Smart

et d'autres

...

Fait à Rabat

signé

Rachid ELAÏDI